

Bruksanvisning – Epikondylitspänne

Catell rekommenderar att produkten provas ut och anpassas av legitimerad eller övrigt utbildad sjukvårdskunnig personal. Brukare med diabetes, känslig hud, kända kontaktallergier, nedsatt känsel eller dålig cirkulation ska vara extra observant för tryck, skav eller ödem under användning. Kontrollera alltid materialinnehåll nedan. Om frågor kring produkten uppstår kontakta din ordinator, utprovare eller Catell.

Användningsområde

Lateral eller Medial epikondyalgia.

Ortosen stödjer och avlastar överbelastad muskulatur samt senfästerna kring armbågen och har därmed en smärtlindrande effekt. Kan kompletteras eller alterneras med en handledsortos.

Applicering

Lateral epikondyalgia ("tennisarmbåge"):

Placera spännnet med pelotten mot utsidan av underarmen, strax nedanför armbågen.



Medial epikondyalgia ("golfarmbåge"):

Placera spännnet med pelotten mot insidan av underarmen, strax nedanför armbågen.



Öppna spännets kardborrar, placera pelotten enligt ovan instruktion. På vissa modeller är pelotten flyttbar. Spänn bandet så att önskat tryck och smärtlindring uppstår och ortosen sitter behagligt. Tänk på att inte dra åt för hårt.

Justera spännnet vid behov. Det är viktigt att ortosen sitter bekvämt, utan att klämma, skava eller orsaka stas.

Material

Polyester, polyamid, polyetylen. Produkten är latexfri.

Tvättråd

Slut kardborrbanden. Följ tvättråden nedan. Använd gärna tvättpåse. Låt ortosen dropporka.



Måttabell

One size. Produkten är bilateral.

Denna produkt är endast avsedd att användas på en patient.

Återvinning

Sortera enligt lokala föreskrifter.

Denna produkt överensstämmer med de krav som ställs i den Medicintekniska förordningen 2017:745, klass 1 produkter.



Manufacturer Catell AB

Västberga Allé 26, SE-126 30 Hägersten, Sweden | Phone: +46 8 727 95 30 | info@catell.se | www.catell.se

201001:1

Instruction for use – EPI-strap



Catell recommend that the product is fitted and adapted by a licensed or otherwise qualified health professionals. Users with diabetes, sensitive skin, known contact allergies, impaired sensibility or poor circulation must be extra observant and check for pinching, chafing or edema when using the brace. Always check material content below. Contact your prescriber or Catell if questions about the product occur.

Area of use

Lateral or Medial epicondylitis.

The brace supports overused muscles and tendons in the elbow area and will through this cause pain relief. The brace can be used in combination with, or altered with, a wrist brace.

Application

Lateral epicondylitis ("tennis elbow"):

Place the brace with the pad placed towards the outside of the forearm, just below the elbow.



Medial epicondylitis ("golfer's elbow"):

Place the brace with the pad placed towards the inside of the forearm, just below the elbow.



Open hook and loop, place the brace with the pad as instructed above. In some models, the pad is adjustable. Tighten the strap so that the desired pressure and pain relief are created and the brace fits comfortably. Remember not to tighten too much.

When necessary adjust the brace. It is important that the brace fits comfortably without pinching, chafing or affect blood circulation.

Material

Polyester, polyamide, polyethylene. Free from latex.

Washing instructions

Close the hook and loop straps. Follow the washing instructions below. Use a washing pouch. Let the brace drip dry.



Size

One size. The product is bilateral. Single patient use.

Recycling

Sort according to local regulations.

This device conforms to the requirements of the Medical Device Regulation 2017:745, product class 1.



Manufacturer Catell AB

Västberga Allé 26, SE-126 30 Hägersten, Sweden | Phone: +46 8 727 95 30 | info@catell.se | www.catell.se

201001:1